

A 型肝炎疫苗

接种须知

许多疫苗信息声明均提供西班牙语以及其他语言的版本。请参阅 www.immunize.org/vis

Hojas de información Sobre Vacunas están disponibles en español y en muchos otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis

1 什么是 A 型肝炎？

A 型肝炎是 A 型肝炎病毒 (HAV) 引起的一种严重肝病。HAV 存在于 A 型肝炎患者的粪便中。

HAV 通常是通过与人密切接触进行传播，有时是通过摄入含 HAV 的食物或水进行传播。患有 A 型肝炎的人士会很容易将疾病传染给同住的其他人士。

A 型肝炎可导致：

- “似流感”的疾病
- 黄疸（皮肤或眼睛呈黄色、深色尿液）
- 剧烈胃痛及腹泻（儿童）

患有 A 型肝炎的人士通常需要住院治疗（多达每 5 人中有 1 人）。

患有 A 型肝炎的成人往往因病情严重而无法工作，时间长达一个月之久。

有时，A 型肝炎也会致命（每 1,000 个病例中死亡人数约 3-6 人）。

A 型肝炎疫苗可预防 A 型肝炎。

2 哪些人士应接种 A 型肝炎疫苗，应于何时接种？

接种对象

应常规地接种 A 型肝炎疫苗的部分人士有：

- 一岁至两岁（12 至 23 个月）之间的所有儿童。
- 年满一岁及以上、前往 A 型肝炎发病率较高或中等的国家旅行或在这些国家工作的任何人士，例如中美或南美、墨西哥、亚洲（日本除外）、非洲及东欧。如需了解更多信息，请查看 www.cdc.gov/travel。
- 年龄在 2 岁至 18 岁、居住在高发病率需定期接种疫苗的州或社区的儿童及青少年。
- 与其他男性发生性行为的男性。
- 使用街头毒品的人士。
- 患有慢性肝病的人士。
- 接受凝血因子浓缩物治疗的人士。

- 研究感染 HAV 的灵长类动物或在研究实验室中研究 HAV 的人士。
- 计划从 A 型肝炎盛行的国家领养孩子、或照顾该国新来的领养子女的家庭成员。

在若干情况下可能要接种 A 型肝炎疫苗的其他人士（更多详情，请咨询您的医生）：

- 居住在爆发 A 型肝炎的社区、尚未接种疫苗的儿童或青少年。
- 接触过 A 型肝炎病毒的未接种疫苗的人士。
- 希望预防 A 型肝炎、年满一岁或以上的任何人士。不得向未满一岁的儿童接种 A 型肝炎疫苗。

接种时间

对于儿童，应在 12 至 23 个月之间接种第一剂疫苗。2 岁前未接种的儿童可在随后就诊时接种疫苗。

对于面临风险的其他人，可在其希望受到保护或处于感染风险之中时，开始接种 A 型肝炎疫苗系列。

对于旅客，最好在出发前至少一个月开始接种疫苗系列。（如果在出发当日或临近出发日期时接种疫苗，可能仍会有一些保护作用）。

旅行出发前无法接种疫苗、或接种疫苗失效的部分人士可接种免疫球蛋白 (IG)。IG 可即时提供暂时的保护。

持久的保护效果需要接种两剂疫苗。这两剂疫苗应至少相隔 6 个月。

A 型肝炎疫苗可以和其他疫苗一起接种。

3

部分人士不应接种 A 型肝炎疫苗，或应等待合适时机接种疫苗。

- 对于以前接种 A 型肝炎疫苗后出现严重（危及生命）过敏反应的任何人士，不应再进行接种。
- 对任何疫苗成分产生严重（危及生命）过敏的任何人士不应接种疫苗。
- **请告诉您的医生您是否有任何严重过敏情况**，包括严重的乳胶过敏。所有 A 型肝炎疫苗均含有明矾，部分 A 型肝炎疫苗含有 2-苯氧基乙醇。
- 在预定接种疫苗时患有中度或严重疾病的任何人士，可能应在其康复之后再行接种疫苗。请问您的医生。轻微疾病一般不妨碍接种疫苗。
- 如果您已怀孕，请告诉您的医生。由于 A 型肝炎疫苗属非活性（减毒性）疫苗，因此对孕妇或其胎儿的危害极低。但您的医生可根据保护需求，评估疫苗在理论上的任何风险。

4

接种 A 型肝炎疫苗有哪些风险？

像任何药物一样，疫苗可能导致严重问题，例如严重的过敏反应。但 A 型肝炎疫苗造成严重伤害或死亡的风险是极低的。

接种 A 型肝炎疫苗远比患上 A 型肝炎安全。

轻微问题

- 注射疫苗的部位出现疼痛（2 名成人中约有 1 人，6 名儿童中至多有 1 人）
- 头痛（6 名成人中约有 1 人，25 名儿童中约有 1 人）
- 食欲不振（12 名儿童中约有 1 人）
- 倦怠（14 名成人中约有 1 人）

这些问题通常会持续 1 或 2 天即会消失。

严重问题

- 在接种后数分钟至数小时内出现严重的过敏反应（非常罕见）。

5

如果出现严重反应该怎么办？

我应该注意什么？

- 注意与您有关的任何问题，例如严重过敏反应、发高烧或行为改变的迹象。

严重过敏反应的迹象包括荨麻疹、面部和喉咙肿胀、呼吸困难、心跳加快、头晕和虚弱。这些症状可能在接种疫苗后的数分钟到数小时内出现。

我该怎么办？

- 如果您认为它是严重过敏反应或其他紧急情况，请立即拨打 9-1-1 或将人员送往最近的医院。或者联系您的医生。
- 之后，应向疫苗不良事件报告系统 (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 报告不良反应。您的医生可能记录此报告，或者，您可以通过 VAERS 网站 (www.vaers.hhs.gov) 或拨打 1-800-822-7967 自行记录。

VAERS 仅用于报告反应。它们不会提供医疗建议。

6

国家疫苗伤害赔偿计划

国家疫苗伤害赔偿计划 (National Vaccine Injury Compensation Program, VICP) 是一项联邦计划，旨在对由于接种特定疫苗而受到伤害的人进行赔偿。

认为自己由于接种疫苗而受到伤害的人士，可通过拨打电话 1-800-338-2382 或访问 VICP 网站 (www.hrsa.gov/vaccinecompensation) 了解与计划和提出赔偿要求有关的详细信息。

7

我如何获得更多的信息？

- 请询问您的医生。
- 联系您的本地或州健康部门。
- 联系疾病控制和预防中心 (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
 - 拨打 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) 或
 - 访问 CDC 的网站: www.cdc.gov/vaccines

Vaccine Information Statement (Interim)
Hepatitis A Vaccine

10/25/2011

Simplified Chinese

